

Instrucciones Bi-hélice: Cómo cuidar de su expansor



Cuándo: Use su aparato Bi- Helice 24 horas al día. Usted debe comer, dormir y vivir en él! Usted NO debe quitarcelo. Dr. Cooke es la única que puede quitar el expansor.

Activacion: Dr. Cooke hará la expansión en este aparato, usted NO tendrá que moverle el expansor.

Alimentación: Se debe usar su aparato Bi-helice cuando usted come. Usted debe cepillar sus dientes y el aparato después de comer, el

expansor siempre debe permanecer en la boca. Cuando usted está comiendo, la comida puede atorarse alrededor de los alambres. Tome un vaso de agua y haga buches para que la comida se salga. Usted aprenderá cómo lidiar con los alimentos en sus alambres a medida que avanza el tratamiento.

Cuidados: Cepille su aparato cuando se cepille los dientes. Cepille lo largo de la línea de las encías para que sus encías no se inflamen. Usted tendrá que utilizar fluoruro cada noche para una máxima protección.

Momentos difíciles: Tratamos de asegurarnos de que todo esté suave antes de salir de la oficina. Sin embargo, la lengua y los labios pueden ser áreas que no podamos. Por favor, ponga la cera sobre la area irritada. Si la irritación no desaparece, por favor llame a la oficina para que podamos ajustar el aparato.

¿Por qué un Bi- helice? El bi -hélice es un aparato eficiente, que crea un espacio en la mandibula inferior. Se cementa para que los padres no se preocupen de que el paciente pierda el aparato y que funcione las 24 horas del día.

Secuencia de eventos: Primero coloque los separadores, 10 días después ajustaremos las bandas, tomaremos una impresión y volveremos a colocar los separadores. Cerca de 2 semanas después el bi -hélice se cementa.

Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta!